

PROTOCOLO DE DESPARASITACION Y VACUNACION CANINA

La desparasitación interna

La presencia de parásitos intestinales disminuye la eficacia vacunal, por ello los cachorros deberán siempre ser desparasitados internamente antes de comenzar con el plan de vacunación.

Para identificar la presencia y el tipo de parásitos se realiza un examen coprológico (análisis de heces) para establecer el plan de desparasitación más adecuado del cachorro.

De forma general, la desparasitación se inicia a los 21 días de nacido y al mes siguiente.

Posteriormente la frecuencia recomendada para la desparasitación interna es de al menos 4 veces al año, es decir, de forma trimestral.

Plan de vacunación canina

*Si el cachorro estaba tomando leche materna al momento de adquirirlo, deberemos esperar de 2 a 3 semanas para vacunarlos, así evitamos que los anticuerpos de la vacuna se solapen con los anticuerpos adquiridos del calostro, pudiendo anular el efecto de ambos y quedando el cachorro sin protección alguna.

*Si el cachorro se ha destetado tempranamente, deberá vacunarse a las 6 semanas contra la Parvovirus.

Primera vacuna a los 2 meses y medio de edad: *Moquillo canino* y *Parvovirus canino*.

Periódicamente se realizan vacunaciones con intervalo de 15 días:

Segunda vacunación: *Moquillo canino*, *Parvovirus canino*, *Adenovirus canino tipo b*, *Coronavirus*, *Parainfluenza canino* y *Leptospira spp.*

Tercera vacunación: Refuerzo de la vacuna anterior

Cuarta vacunación: A los 4 a 5 meses de edad. De carácter obligatorio. Vacuna contra el virus de la *Rabia*.

La revacunación recomendada para la vacuna heptavalente y de la rabia es de forma anual.

Otros

Vacuna contra la Traqueobronquitis infecciosa canina (Tos de las perreras): Recomendada especialmente para la protección de la enfermedad producida por *Bordetella bronchiseptica* y Virus *Parainfluenza canino* (CPI). A partir de las 3 semanas de edad, aplicada generalmente junto con la primera vacuna de parvovirus canino. De revacunación anual.

Vacuna contra la Leishmaniosis canina: A partir de los 6 meses de edad en perros que sean negativos a la enfermedad mediante un diagnóstico en sangre. De revacunación anual.

Endectocida inyectable contra la Dirofilariosis Cardiopulmonar Canina (Gusano del corazón): Antiparasitario frente a *Dirofilaria immitis* en perros a partir de los 2 meses y medio de edad y de protección anual.

PetitCAN
Escuela Canina & Veterinaria

La desparasitación externa

Estos parásitos viven en el exterior del cuerpo del animal, la desparasitación externa da protección contra pulgas, piojos, garrapatas y mosquitos o flebótomos.

*Pipeta: Una vez al mes

*Collar antiparasitario: Cada 6 meses