

PROTOCOLO DE DESPARASITACION Y VACUNACION FELINA

La desparasitación interna

La presencia de parásitos intestinales disminuye la eficacia vacunal, por ello deberán siempre ser desparasitados internamente antes de comenzar con el plan de vacunación.

Para identificar la presencia y el tipo de parásitos se realiza un examen coprológico (análisis de heces) para establecer el plan de desparasitación más adecuado.

De forma general, la desparasitación se inicia a los 21 días de nacido y refuerzo cada 5 días según el caso.

Posteriormente la frecuencia recomendada para la desparasitación interna es de al menos 4 veces al año, es decir, de forma trimestral.

Plan de vacunación felina

Primera vacuna a los 2 meses de edad:. Triple felina: *Calicivirus felino (FCV)*, *herpesvirus felino (FHV) tipo 1* y virus de la *panleucopenia felina (FPLV)* .

Periódicamente se realizan vacunaciones con intervalo de 15 días:

Segunda vacunación: Vacuna contra la Leucemia felina en caso de ser negativo a la enfermedad.

Tercera vacunación: Refuerzo de la vacuna triple felina.

Cuarta vacunación: Refuerzo de la vacuna de Leucemia.

Quinta vacunación: A los 4 a 5 meses de edad. Vacuna contra el virus de la *Rabia*.

La revacunación recomendada para la vacuna trivalente, leucemia y de la rabia es de forma anual.

Otros


Vacuna contra la Peritonitis infecciosa felina: Para la protección frente al *virus de la Peritonitis Infecciosa Felina*. A partir de las 16 semanas de edad. De revacunación anual.

La desparasitación externa

Estos parásitos viven en el exterior del cuerpo del animal, la desparasitación externa da protección contra pulgas, piojos, garrapatas y algunas para ácaros.

*Pipeta: Una vez al mes

*Collar antiparasitario: Cada 4 meses



PetitCAN
Escuela Canina & Veterinaria